

# R-CHOP療法



			Day 1	8	15	22
リツキサン	375mg/m <sup>2</sup>	静注	↓			↓
アドリアシン	50mg/m <sup>2</sup>	静注	↓			↓
オンコビン	1.4mg/m <sup>2</sup>	静注	↓			↓
エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup>	静注	↓			↓

投与サイクル	3週間毎	サイクル数	8サイクル
--------	------	-------	-------

薬剤	用量	投与経路	投与時間
<b>抗がん剤 Day1</b>			
アロキシ 水溶性プレドニン パラミン 生食	0.75mg 100mg 5mg 100ml	静注	30分
リツキサン 生食	375mg/m <sup>2</sup> 500ml	静注	初回:最初の30分 50mL/時、 30分毎に50mL/時ずつ増量可能 2回目以降:最初の30分 100mL/時、 30分毎に100mL/時ずつ増量可能
アドリアシン 生食	50mg/m <sup>2</sup> 100ml	静注	30分
オンコビン 生食	1.4mg/m <sup>2</sup> 50ml	静注	15分
エンドキサン 生食	750mg/m <sup>2</sup> 500ml	静注	120分
<b>経口剤 Day1</b>			
アセトアミノフェン	500mg	経口	1錠 開始時に内服、Day1
<b>経口剤 Day2~5</b>			
プレドニン	100mg	経口	分2(朝、夕食後) Day2~5