

FOLFOX+アバスチン療法

			Day 1	2	3・・・	15
アバスチン	5mg/kg	静注	↓			↓
レボホリナート	200mg/m ²	静注	↓			↓
エルプラット	85mg/m ²	静注	↓			↓
フルオロウラシル	400mg/m ²	静注	↓			↓
フルオロウラシル	2400mg/m ²	静注	→ (Blue arrow)			→ (Green arrow)

投与サイクル	2週間毎	サイクル数	憎悪または忍容性がない場合まで継続
--------	------	-------	-------------------

投与方法

薬剤	用量	投与経路	投与時間
抗がん剤 Day1			
アロキシ デカドロン 生食	0.75mg 6.6mg 100ml	静注	30分
アバスチン 生食	5mg/kg 100ml	静注	初回90分、2回目60分 3回目以降30分
レボホリナート 5%糖液	200mg/m ² 250ml	静注	120分 (エルプラットと同時投与)
エルプラット 5%糖液	85mg/m ² 250ml	静注	120分 (レボホリナートと 同時投与)
5-FU 生食	400mg/m ² 100ml	静注	急速静注
5-FU 生食	2400mg/m ² 適量	静注	46時間持続
経口制吐剤			
イメンドカプセルセット	1日目 125mg 2~3日目 80mg	経口	分1 Day1~3
デカドロン	4mg	経口	分2(朝、夕食後) Day2、3